

Przygotowanie pacjenta do pobrania kału		LA 2.1
	WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SPZOZ W NOWEJ SOLI	I-12
		Wydanie: 03
		Ważne od: 02.06.2025

Pobranie kału na obecność pasożytów i krwi utajnionej

Do badania potrzebna jest niewielka ilość kału - wielkości orzecha laskowego. Pojemnik do badania kału powinien być jednorazowy (do zakupienia w aptece).

Kał bada się na obecność jaj pasożytów, lambliozy, krwi utajnionej, kalprotektyny, resztek pokarmowych, *Helicobacter pylori* Antygen.

- Próbkę do badania kału na obecność jaj pasożytów** powinno się pobierać trzykrotnie w odstępach 3-4 dni (według zaleceń lekarza).
- Próbkę do badania kału na krew utajnią, lambliozę i kalprotektynę** pobiera się jednorazowo.
- Do badania kału na krew utajnią i kalprotektynę**
 - nie obowiązuje zachowanie specjalnej diety,
 - nie należy pobierać materiału w czasie miesiączki oraz 3 dni przed i po niej, jak również gdy pacjent cierpi na krwawiące hemoroidy,
 - alkohol, aspiryna mogą spowodować podrażnienie przewodu pokarmowego i niewielkie krwawienie. Takie substancje należy odstawić przynajmniej na 48 godzin przed badaniem.

Pojemnik z kałem należy szczelnie zamknąć i czytelnie opisać drukowanymi literami: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, DATĘ pobrania próbki. Próbkę należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (najlepiej w ciągu 2-4 godzin od pobrania próbki).

Opracował: Kierownik Szpitalnego Laboratorium Analitycznego